Institut für Gastroenterologie und Rheumatologie

Leitung: Prim. Univ. Prof. Dr. Heinrich Resch
Stellvertretung: OÄ Dr. Judith Haschka

Krankenhaus Barmherzige Schwestern, 1060 Wien, Stumpergasse 13
E-Mail: heinrich.resch@bhs.at

„Patienten-orientierte Forschung“

Schwerpunkte

Das Institut für Gastroenterologie hat zahlreiche Therapiestudien sowohl in der Rheumatologie als auch der Gastroenterologie durchgeführt.

Therapiestudien – Rheumatologie:

- Phase 3b/4, randomisierte, aktiv-kontrollierte, Parallel-Gruppe, Baricitinib in Patienten mit Rheumatoider Arthritis (I4V-MC-JAJA (a) (RA-BRIDGE), Eli Lilly)
- Phase 3, doppelt-blind, randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie, Upadacitinib in Patienten mit Riesenzellarteriitis, (GCA-M16-852 AbbVie, SELECT-GCA)
- Phase 3 doppelt-blind, randomisierte Studien mit einem IL-17 Inhibitor (Secukinumab, Fa Novartis) bei Psoriasisarthritis, ankylosierender Spondylitis und nicht-radiographischer Spondyloarthritis (nr-ax SpA, CAIN457H2315, Novartis)
- Phase 3 Studie doppelt blind, randomisiert mit IL-17 Hemmung (Ixekizumab) bei nicht-radiographischer Spondyloarthritis (nr-ax SpA, I1F-MC- RHBX und I1F-MC- RHBY)
- Phase 3 Studie mit einem Januskinaseinhibitor (ABT-494, AbbVie M13-542 und M15-55) bei Rheumatoider Arthritis
- Phase 3 Studie, doppelt blind, randomisiert, IL-17 Hemmung (Ixekizumab) vs. TNF-Inhibitor (Adalimumab) bei Patienten mit Psoriasisarthritis (SPIRIT-H2H, I1F-MC-RHCF, Eli Lilly)
- NIS-Beobachtungsstudie Real-Life Daten, Patienten mit Plaque Psoriasis, Psoriasisarthritis oder Ankylosierender Spondylitis unter IL-17-Blockade (Secukinumab, Novartis)

Therapiestudien – Gastroenterologie:

- Phase 3 Studie, doppelt-blind, randomisiert, IL23-Hemmung (Mirikizumab) bei Colitis ulcerosa mit moderater bis hoher Krankheitsaktivität (Fa. Lilly, Eli-Lilly-LUCENT1-I6T-MC-AMAN)
- Phase 3 Studie, doppelt-blind, randomisiert, IL23-Hemmung (Mirikizumab) bei moderatem bis schwerem Morbus Crohn (VIVID-1: (I6T-MC-AMAM), Eli-Lilly)
- Trust Beyond Studie, NIS, Prädiktiver Wert von Ultraschall-Parameter auf das Therapieansprechen bei Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa (AbbVie)

Referate

- Vorträge Osteoporose Forum, St. Wolfgang 2019
- CEE Summit Kiew, Oktober 2019 (Central-Eastern-European)
- Posterpräsentation ACR 2019 (Atlanta)
- Bildgebungsworkshop Düsseldorf
- Senologie Maritimer Kongress 2019 (Kreta)

Zusammenarbeit

- Medizinische Universität Wien – PhD Programm „Bones & Joint Regeneration“
- UKH Lorenz Böhler und UKH Meidling
- SMZ Ost – Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie
- Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie
- Sanitätszentrum Ost, Österreichisches Bundesheer
- Lehrstuhl für Klinische Osteologie Medizinische Fakultät, SFU Wien

Publikation

- Bone Stress Injuries Are Associated With Differences in Bone Microarchitecture in Male Professional Soldiers. Schanda JE, Kocijan R, Resch H, Baierl A, Feichtinger X, Mittermayr R, Plachel F, Wakolbinger R, Wolff K, Fialka C, Gruther W, Muschitz C. J Orthop Res. 2019 Dec;37(12):2516-2523. doi: 10.1002/jor.24442. Epub 2019 Aug 26.